



# **Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

**Universidad del Perú. Decana de América**

**Facultad de Medicina**

**Escuela Académico Profesional de Obstetricia**

## **“Correlación entre violencia basada en género y percepción de dismenorrea primaria en alumnas del nivel secundario – I.E.N°1182 El Bosque – 2011”**

### **TESIS**

**Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia**

### **AUTORES**

**Cynthia CAYLLAHUA GUTIÉRREZ**

**Miriam Magaly TITO LÓPEZ**

### **ASESOR**

**Dr. Erasmo HUERTAS TACCHINO**

**Lima, Perú**

**2012**

## RESUMEN

### ***“CORRELACIÓN ENTRE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y PERCEPCIÓN DE DISMENORREA PRIMARIA EN ALUMNAS DEL NIVEL SECUNDARIO - I.E.N°1182 EL BOSQUE-2011”***

**OBJETIVO.** Determinar la correlación entre Violencia Basada en Género (VBG) y percepción de Dismenorrea Primaria en alumnas del nivel secundario.

**MATERIAL Y MÉTODOS.** Estudio prospectivo, transversal, correlacional; compuesto por 250 alumnas del nivel secundario de la I.E. N°1182 El Bosque, durante el periodo noviembre-diciembre 2011, San Juan de Lurigancho. El método empleado fue la encuesta y la técnica el cuestionario estructurado. Siguiendo los criterios de inclusión y exclusión se procedió a la recolección de datos, posteriormente fueron tabuladas en tablas y gráficos del programa SPSS 17. Se aplicó estadística descriptiva e inferencial coeficiente de correlación de Spearman significativo  $p < 0,05$

**RESULTADOS.** El grado de instrucción predominante fue el segundo (29.6%), la edad que predominó fue la de 13 años (26.4%), el 72.4% afirmaron vivir con sus padres y el 74.4% refirieron hacer ejercicios regularmente. Referente a los hábitos nocivos el 85.6% afirmaron consumir, café, té o gaseosa, el 17.6% afirmaron haber fumado, el 35.2% han consumido bebidas alcohólicas y 0.8% afirmaron haber usado o estar usando drogas. El 42.8% refirieron que su menarquia fue a los 12 años y 47.2% manifestaron tener una duración de su menstruación de 3 a 4 días. Además se halló que la Percepción de Dismenorrea Primaria usando la variable VBG logra explicar el 97.8% el Coeficiente de Correlación fue 0.989, indicando que existe una correlación muy alta; con respecto a la Percepción de Dismenorrea Primaria usando la variable VBG de tipo sexual esta logra explicar el 95.1% y el coeficiente de correlación fue 0.975, indicando una correlación muy alta; la Percepción de Dismenorrea Primaria usando la variable VBG de tipo Psicológica logra explicar el 1.08% ajustándose débilmente al modelo y por último la Percepción de Dismenorrea Primaria usando la variable VBG de tipo física logra explicar el 97.5% y el coeficiente de correlación es de 0.98 indicando una correlación muy alta.

**CONCLUSIONES.** Existe correlación entre la Violencia basada en género y percepción de Dismenorrea primaria en alumnas del nivel secundario.

**PALABRAS CLAVE:** Violencia Basada en Género y Dismenorrea Primaria.